



**Gebrauchsinformation**  
bitte sorgfältig lesen!



# Gencydo® 0,1%

## Augentropfen

### Zusammensetzung

10 g (= 10 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile:  
8 - 12 mg Citrus limon, Succus, entsprechend 0,65 mg Fruchtsäuren, berechnet als Citronensäure / 30 mg wässriger Auszug aus Cydonia oblonga, Fructus rec. (1:2,1).

Sonstige Bestandteile: Kaliumnitrat, Natriumhydroxid, Wasser für Injektionszwecke; oligodynamische Silberkonservierung.

### Darreichungsform und Packungsgröße

10 ml Augentropfen

### Anthroposophisches Arzneimittel bei allergischen Erkrankungen

**Weleda AG Postfach 1309/1320 D-73503 Schwäbisch Gmünd**

### Anwendungsgebiete

gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis  
Dazu gehören: Behandlung allergischer Augenreizungen, z.B. bei Heuschnupfen.

Bei starken Schmerzen im Bereich der Augen oder bei plötzlichem Nachlassen des Sehvermögens ist unverzüglich ein Arzt aufzusuchen. Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden ist es ebenfalls ratsam, einen Arzt zu konsultieren.

### Gegenanzeigen

*Wann dürfen Sie Gencydo® 0,1% Augentropfen nicht anwenden?*

Gencydo® 0,1% Augentropfen dürfen nicht angewendet werden, wenn Sie überempfindlich gegen Zitrusfrüchte sind oder wenn Sie unter trockenen Augen (verminderte Tränensekretion) leiden.

*Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?*

Bei Säuglingen und Kleinkindern bis zu 5 Jahren sollen Gencydo® 0,1% Augentropfen nicht angewendet werden, da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen.

### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

*Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?*

Wie alle Arzneimittel sollte Gencydo® 0,1% in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.



## Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Keine bekannt

## Dosierung und Art der Anwendung

Soweit nicht anders verordnet, von Gencydo<sup>®</sup> 0,1% Augentropfen 1 - 3 mal täglich 1 Tropfen in den Bindehautsack träufeln.

## Dauer der Anwendung

Gencydo<sup>®</sup> 0,1% Augentropfen sollen bis zum Abklingen der Beschwerden angewendet werden. Die Behandlung kann sich, je nach dem auf welche Pollen die allergische Reaktion erfolgt bzw. je nach Wetterlage, über mehrere Tage bis Wochen erstrecken.

Die Dauer der Behandlung von chronischen Erkrankungen erfordert eine Absprache mit dem Arzt.

## Nebenwirkungen

Gencydo<sup>®</sup> 0,1% Augentropfen können, insbesondere bei trockenen Augen, nach dem Einträufeln im Auge zunächst ein leichtes Brennen verursachen, das jedoch rasch abklingt.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind.

## Hinweise

Nach Ablauf des auf dem Etikett und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatums sollte das Präparat nicht mehr angewendet werden.

Nach dem ersten Öffnen des Behältnisses sollen Gencydo<sup>®</sup> 0,1% Augentropfen nicht länger als 4 Wochen angewendet werden. Bitte tragen Sie das Datum in das dafür vorgesehene Feld auf dem Etikett und der Faltschachtel ein.

**Stand der Information:** Februar 2005

---

## Bitte beachten:

1. Vor dem ersten Gebrauch Originalverschluss an der vorgesehenen Lasche aufreißen. Die Augentropfen in geschlossenem Zustand einmal kurz mit dem Kopf nach unten schütteln.
2. Schutzkappe entfernen.
3. Durch Druck auf das Gummiteil Tropfen ins Auge träufeln.
4. Schutzkappe sofort wieder fest aufdrücken.